

う蝕リスク検査結果

検査日：令和3年 12 月 26 日

ID： 患者氏名： 様 担当者： 土黒

疾患指標：既にあるう蝕（1つ以上当てはまるとハイリスク！）	あなたの検査結果	当てはまる項目に✓		
視診、またはレントゲンで確認可能な窩（象牙質う蝕）	✓	✓		
レントゲン上で確認出来る隣接面う蝕（エナメル質う蝕）		✓		
歯面上のホワイトスポット（1歯以上）	✓	✓		
3年以内の保存修復治療		✓		
リスク因子：う蝕を進行させるリスク要因				
唾液分泌量が少ない（2.5ml/5分以下）	3.5 ml/5分			
唾液分泌を減少させるような要因（放射線治療・服薬・全身疾患など）				
日に3回以上の間食				
視診可能プラーク	✓		✓	
深い小窩裂溝（1歯以上）			✓	
根面露出（1歯以上）	✓		✓	
矯正器具の装着			✓	
ミュータンス菌(SM) class1以上	SM : class 3		✓	
ラクトバチラス菌(LB) class1以上	LB : class 1		✓	
防御因子：う蝕を予防する要因				
唾液分泌量が多い（5.5ml/5分以上）	3.5 ml/5分			
日に1回のフッ化物配合歯磨き粉使用				
日に2回以上のフッ化物配合歯磨き粉の使用				
0.05%以上のフッ化物洗口液使用				
歯科医院における過去6ヶ月以内のフッ化物歯面塗布				
キシリトールガム（シュガーフリー）の使用（4回/1日×6ヶ月以上）				
過去6ヶ月以上のカルシウム及びリン酸配合歯磨剤使用				

リスクレベル			
エクストリーム	ハイ	ミドル	ロー

2	3	0
↓	↓	↓
う蝕	▲	健康

必要なセルフケア	
<input checked="" type="checkbox"/> 飲食習慣の改善	<input checked="" type="checkbox"/> フッ化物の使用 <input checked="" type="checkbox"/> キシリトールの使用

赤坂さくら歯科クリニック

TEL：03-6807-4817